

Cultivo	Plaga	Dosis	Periodo de carencia	Momento de aplicación
Vid	Oídio de la vid ( <i>Uncinula necator</i> )	43 cm <sup>3</sup> /100 lt agua	35 días	Aplicar en forma preventiva cuando el fruto tiene 3 mm de diámetro.
Trigo	Golpe blanco ( <i>Fusarium graminearum</i> )	350-450 cm <sup>3</sup> /ha	35 días	Aplicar en forma preventiva a la espiga en floración. Al observar las primeras pústulas o manchas.
	Mancha amarilla ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> )			
	Mancha de la hoja del trigo ( <i>Septoria tritici</i> )			
	Oídio del trigo ( <i>Erysiphe graminis</i> f. sp. <i>tritici</i> )			
	Roya anaranjada ( <i>Puccinia recondita</i> )			
Maní	Viruela tardía ( <i>Mycosphaerella berkeleyi</i> ) Viruela temprana ( <i>Cercospora arachidicola</i> )	860 cm <sup>3</sup> /ha	35 días	Iniciar los tratamientos con la presencia de las primeras manchas foliares de la enfermedad.
Papa	Tizón temprano de la papa ( <i>Alternaria solani</i> )	860 cm <sup>3</sup> /ha	30 días	Iniciar los tratamientos preventivos cuando se presentan las condiciones predisponentes. Repetir cada 10 – 14 días.
Avena	Roya amarilla de la avena ( <i>Puccinia coronata</i> f. sp. <i>avenae</i> )	860 cm <sup>3</sup> /ha	30 días	Comenzar la aplicación al observar los primeros signos de la enfermedad.
Cebada	Mancha en red ( <i>Drechslera teres</i> )	860 cm <sup>3</sup> /ha	30 días	Comenzar la aplicación al observar los primeros signos de la enfermedad.
Centeno	Roya anaranjada de la hoja ( <i>Puccinia recondita</i> f. sp. <i>recondita</i> ) Roya negra del tallo ( <i>Puccinia graminis</i> f. sp. <i>secalis</i> )	860 cm <sup>3</sup> /ha	70 días	Comenzar la aplicación al observar los primeros signos de la enfermedad.
Clavel	Manchas florales, Royas y oidios	500-700 cm <sup>3</sup> /ha	30 días	Aplicar de acuerdo a las condiciones climáticas predisponentes o a los Servicios de Alarma disponibles.

Crisantemo Ornamentales Rosales				Rotar o combinar con productos de diferente grupo químico.
Durazno	Podredumbre morena de los frutales (Monilinia fruticola)	30 cm <sup>3</sup> /ha	7 días	Se recomienda realizar 2 aplicaciones 30 y 15 días antes de la cosecha. Ante la observación de condiciones predisponentes, realizar aplicaciones adicionales principalmente en floración. Rotar con productos de diferente grupo químico. (**) Con efecto de protección postcosecha.

**Peligro:** su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente, lea atentamente la etiqueta