

INSECTICIDA – ACARICIDA  
GRUPO 3A

**ENTREVERO EC**  
CONCENTRADO EMULSIONABLE

Composición:

<b>bifentrin:</b> (2-metil(1,1-bifenil) - 3-il) metil 3 - (-2-cloro-3,3,3 trifluoro-1-propenil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato.....	10 g
Solventes e inertes c.s.p.....	100 cm <sup>3</sup>

**LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.**

Inscrito ante el SENASA con el N° 36.695



Lote N°:

Vencimiento:

NO INFLAMABLE

ORIGEN: ARGENTINA

Contenido Neto:

**Atanor SCA.** Albarellos 4914(B1605AFR) Munro – Prov. De Bs. As.

Tel. 011 4721-3400 – Fax: 011 4721-3480

[www.albaugh.com.ar](http://www.albaugh.com.ar)



AVISO DE RESPONSABILIDAD LEGAL: ATANOR S.C.A. no se responsabiliza por los efectos y/o resultados que deriven de no haberse ajustado estrictamente a las especificaciones del presente rótulo.



Banda toxicológica de color Amarillo

Rev. 01

ENTREVERO EC

1 de 11

**CASA CENTRAL**  
Albarellos 4914 - (B1605AFR)  
Munro - Buenos Aires - Argentina  
TE: +54 (11) 4721-3400 / 7400 (Líneas rotativas)

**PLANTA PILAR**  
Calle 3 y 8 - (1629)  
Parque Industrial Pilar - Buenos Aires  
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

**PLANTA RIO III**  
Paula A. de Sarmiento s/n° y Avda. Savio - (5850)  
Rio III - Córdoba  
TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

**PLANTA SAN NICOLAS**  
Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia) - (2900)  
San Nicolás - Buenos Aires  
TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

## RECOMENDACIONES DE USO

### GENERALIDADES DEL PRODUCTO:

**ENTREVERO EC** es un insecticida-acaricida piretroide que actúa por contacto e ingestión y a muy bajas dosis. Controla insectos del orden de lepidópteros, homópteros, hemípteros y otros que atacan los cultivos agrícolas.

### INSTRUCCIONES PARA EL USO:

**Preparación:** **ENTREVERO EC** es un concentrado emulsionable, para su correcta aplicación debe ser aplicado en agua limpia. Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:

- Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar la aplicación.
- Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el sistema de agitación.
- Añadir la dosis requerida de **ENTREVERO EC**, de acuerdo con la calibración realizada, directamente al tanque y sin dilución previa. Verificar que el producto se mezcle completamente.
- Completar el tanque con agua hasta el volumen final. Corroborar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la emulsión. Reagitar el caldo antes de reanudar la aplicación. **Utilizar siempre agua limpia.**

**IMPORTANTE:** El sistema de retorno debe funcionar en todo momento. No mezclar los productos puros.

### EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:

**ENTREVERO EC** puede aplicarse con equipos pulverizadores terrestres convencionales o aéreos.

**Equipos terrestres:** Los caudales de agua de 100 a 200 litros por ha.

**Equipos aéreos:** 15 a 20 litros de agua por ha.

Utilizar picos que garanticen una distribución uniforme del pulverizado (50-70 gotas por cm<sup>2</sup>).

## RECOMENDACIONES DE USO:

Se recomienda para lograr un uso óptimo del producto:

- Respetar dosis indicadas.
- Cobertura correcta.
- Respetar momento de aplicación.
- Usar pastillas de cono hueco para insecticidas pudiendo elegir entre las que ofrece el mercado.
- Respetar la presión de trabajo en función del flujo y tamaño de la gota producida recomendado por el fabricante.
- Lograr una cobertura correcta llegando a 50 a 70 gotas/cm<sup>2</sup> y un C.V. de 50%.
- Evitar hacer pulverizaciones con vientos mayores a 10 km/h.

Consulte a un ingeniero agrónomo para calibrar correctamente el equipo.

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Duraznero	<b>Pulgón verde del duraznero, Pulgón rojo</b> ( <i>myzus persicae</i> )	10 cm <sup>3</sup> /hl	a) Contra la hembra fundadora, en aplicaciones tempranas. Pulverizar en coincidencia con hinchazón de las yemas (se recomienda mojar muy bien, ya que los huevos de los cuales nace la hembra fundadora están ubicados en las yemas). b) Contra colonias establecidas. En primavera al observar los primeros ataques y preferiblemente antes del “enrulamiento” de las hojas.
Manzano	<b>Acaro tejedor</b> ( <i>tetranychus urticae</i> ) <b>Arañuela roja europea</b> ( <i>panonychus ulmi</i> )	20 – 30 cm <sup>3</sup> /hl	Cuando se observen los primeros ataques con una población media de 4-5 ácaros por hoja. En caso de infestación severa usar la dosis mayor. Cuando el Bifentrin es empleado sistemáticamente para el control de la Carpocapsa siguiendo un programa integral de curas, las arañuelas y las chicharritas son simultáneamente controladas, manteniéndose las poblaciones de ambas plagas por debajo el nivel de daño económico. Esto por lo general permite reducir el número de tratamientos específicos contra ellas.

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Manzano	<b>Bicho canasto</b> ( <i>oliketicus platensis</i> )	20 cm <sup>3</sup> /hl	Cuando se observan las primeras larvas y no hayan superado el tercer estadio.
	<b>Chicharritas</b> ( <i>cercópidos</i> )	20 cm <sup>3</sup> /hl	En caso de infestación severa usar la dosis mayor. Cuando el Bifentrin es empleado sistemáticamente para el control de la Carpocapsa siguiendo un programa integral de curas, las arañuelas y las chicharritas son simultáneamente controladas, manteniéndose las poblaciones de ambas plagas por debajo el nivel de daño económico. Esto por lo general permite reducir el número de tratamientos específicos contra ellas.
	<b>Gusano de la pera y de la manzana</b> ( <i>carpocapsa pomponella</i> )	20 cm <sup>3</sup> /hl	Aplicación foliar siguiendo las indicaciones de los servicios de alarma o según vuelos de adultos caídos en trampas de feromonas, según indicaciones de sus fabricantes.
	<b>Psílido del peral</b> ( <i>cacopsyla pyricola</i> )	20 – 30 cm <sup>3</sup> /hl	A la aparición de “mosquitas” o a la primera gota de “melaza”. Aplicar usando gran volumen y buena presión.
Papa	<b>Pulgón verde del duraznero,</b> <b>Pulgón rojo</b> ( <i>myzus persicae</i> )	70 cm <sup>3</sup> /hl	Emplear no menos de 750 litros de líquido total por hectárea para asegurar una buena distribución, cobertura y mojado.

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Peral	<b>Acaro tejedor</b> ( <i>tetranychus urticae</i> ) <b>Arañuela roja europea</b> ( <i>paponychus olmi</i> )	20 – 30 cm <sup>3</sup> /hl	Cuando se observen los primeros ataques con una población media de 4-5 ácaros por hoja. En caso de infestación severa usar la dosis mayor. Cuando el Bifentrin es empleado sistemáticamente para el control de la Carpocapsa siguiendo un programa integral de curas, las arañuelas y las chicharritas son simultáneamente controladas, manteniéndose las poblaciones de ambas plagas por debajo del nivel de daño económico. Esto por lo general permite reducir el número de tratamientos específicos contra ellas.
	<b>Bicho canasto</b> ( <i>olicketicus platensis</i> )	20 cm <sup>3</sup> /hl	Cuando se observan las primeras larvas y no hayan superado el tercer estadio
	<b>Chicharritas</b> ( <i>cercopidos</i> )	20 cm <sup>3</sup> /hl	En caso de infestación severa usar la dosis mayor. Cuando el Bifentrin es empleado sistemáticamente para el control de la Carpocapsa siguiendo un programa integral de curas, las arañuelas y las chicharritas son simultáneamente controladas, manteniéndose las poblaciones de ambas plagas por debajo del nivel de daño económico. Esto por lo general permite reducir el número de tratamientos específicos contra ellas.
	<b>Gusano de la pera y de la manzana</b> ( <i>carpocapsa pomponella</i> )	20 cm <sup>3</sup> /hl	Aplicación foliar siguiendo las indicaciones de los servicios de alarma o según vuelos de adultos caídos en trampas de feromonas, según indicaciones de sus fabricantes.
	<b>Psílido del peral</b> ( <i>cacopsyla pyricola</i> )	20 – 30 cm <sup>3</sup> /hl	A la aparición de “mosquitas” o a la primera gota de “melaza”. Aplicar usando gran volumen y buena presión.

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Poroto	<b>Chicharritas</b> ( <i>cercópidos</i> ) <b>Mosca blanca</b> ( <i>bermicia tabaco</i> )	60 cm <sup>3</sup> /hl	Cuando se observe la aparición de la plaga.
Soja	<b>Chinche de la alfalfa</b> ( <i>piezodorus guildinii</i> ), <b>Chinche verde</b> ( <i>nezara viridula</i> )	160-180 cm <sup>3</sup> /hl	Cuando se observen 2 chinches por metro lineal de surco.
	<b>Oruga de las leguminosas</b> ( <i>anticarsia gemmatalis</i> )	25-35 cm <sup>3</sup> /ha	Dosificar de acuerdo al desarrollo del cultivo y el grado de infestación. Antes de la floración con 15 isocas/m de surco y mas de 20% de defoliación.
	<b>Trips del poroto</b> ( <i>caliothrips phaseoli</i> )	150 cm <sup>3</sup> /ha	Aplicar para reducir la población en R3 y R5 (mayor influencia sobre el rendimiento) cuando aparezcan 10 trips adultos por folíolo en la parte media de la planta. Repetir en caso de reinfestaciones.

Rev. 01

ENTREVERO EC

6 de 11

**CASA CENTRAL**  
Albarellos 4914 - (B1605AFR)  
Munro - Buenos Aires - Argentina  
TE: +54 (11) 4721-3400 / 7400 (Líneas rotativas)

**PLANTA PILAR**  
Calle 3 y 8 - (1629)  
Parque Industrial Pilar - Buenos Aires  
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

**PLANTA RIO III**  
Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio - (5850)  
Rio III - Córdoba  
TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

**PLANTA SAN NICOLAS**  
Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia) - (2900)  
San Nicolás - Buenos Aires  
TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

## RESTRICCIONES DE USO:

**Período de carencia:** Dejar transcurrir entre la última aplicación y cosecha de las partes comestibles: los siguientes períodos: 15 días en manzano y peral, 7 días en duraznero y papa, 30 días en poroto, y 45 días en soja.

En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

**Tiempo de reingreso al área tratada:** Reingresar al área tratada una vez transcurridas 24 hs de la aplicación.

## COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas, herbicidas de uso corriente, excepto con productos de reacción alcalina. De cualquier modo, se recomienda hacer ensayo previo de compatibilidad en caso de utilizarlo en mezclas.

## FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en las especies vegetales recomendadas y respetando las indicaciones de uso.

## AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Rev. 01

ENTREVERO EC

7 de 11

**CASA CENTRAL**  
Albarellos 4914 - (B1605AFR)  
Munro - Buenos Aires - Argentina  
TE: +54 (11) 4721-3400 / 7400 (Líneas rotativas)

**PLANTA PILAR**  
Calle 3 y 8 - (1629)  
Parque Industrial Pilar - Buenos Aires  
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

**PLANTA RIO III**  
Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio - (5850)  
Rio III - Córdoba  
TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

**PLANTA SAN NICOLAS**  
Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia) - (2900)  
San Nicolás - Buenos Aires  
TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

## PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

## MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:

Este producto es nocivo si es ingerido o absorbido por la piel. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa.

**Para su seguridad durante la preparación y aplicación:** Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.

**Para su seguridad después del tratamiento:** Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante de **ENTREVERO EC** en su envase original, bien cerrado.

## RIESGOS AMBIENTALES:

**Toxicidad para aves:** Prácticamente no tóxico.

**Toxicidad para peces:** Extremadamente tóxico. No contaminar fuentes o cursos de agua. No asperjar sobre espejos de agua, no eliminar caldos remanentes o enjuagar/lavar equipo de aplicación en fuentes de agua. Establecer una franja de 50 metros entre cultivo tratado y la fuente de agua. Evitar la deriva.

**Toxicidad para abejas:** Altamente tóxico. Avisar a los apicultores previo a su aplicación. Si no pueden retirarse las colmenas, cerrar las piqueras durante la aplicación con arpillera húmeda o espuma de goma. Asperjar a primera hora de la mañana o noche, fuera del horario de pecoreo de las abejas.

Rev. 01

ENTREVERO EC

8 de 11



## TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN:

Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. El producto remanente en el tanque de la pulverizadora puede diluirse agregando agua limpia en una cantidad igual a cinco veces el volumen de caldo existente. Se puede aplicar este nuevo preparado sobre barbechos, caminos y áreas no cultivadas ni pastoreadas, alejadas de centros poblados y lugares de tránsito frecuente de personas.

## TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Respetar las siguientes instrucciones para el Triple Lavado Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla).

Realizar este procedimiento **3 veces**. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases perforados deben colocarse en contenedores para ser enviados a una planta especializada para su destrucción final. No enterrar ni quemar a cielo abierto los envases y demás desechos.

## ALMACENAMIENTO:

Almacenar en su envase original, bien cerrado, claramente identificado y lejos de alimentos humanos y forrajes. Mantener fuera del alcance de niños, personas inexpertas y animales domésticos. Guardar en un lugar cerrado con llave. Evitar el contacto directo con la luz solar, fuentes de calor y agentes oxidantes. Evitar temperaturas bajo 0 °C y sobre 35 °C.

## DERRAMES:

Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Rev. 01

ENTREVERO EC

9 de 11

**CASA CENTRAL**  
Albarellos 4914 - (B1605AFR)  
Munro - Buenos Aires - Argentina  
TE: +54 (11) 4721-3400 / 7400 (Líneas rotativas)

**PLANTA PILAR**  
Calle 3 y 8 - (1629)  
Parque Industrial Pilar - Buenos Aires  
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

**PLANTA RIO III**  
Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio - (5850)  
Rio III - Córdoba  
TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

**PLANTA SAN NICOLAS**  
Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia) - (2900)  
San Nicolás - Buenos Aires  
TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

## PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación llamar al médico. Trasladar al paciente a un lugar ventilado.

**En caso de ingestión:** Dar atención médica de inmediato. No inducir el vómito. Beber y enjuagar la boca con abundante agua limpia. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

**En caso de contacto con la piel:** Quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminados. Enjuagar la zona expuesta con abundante agua, por al menos 15 - 20 minutos. Lavar la ropa que hubiese tomado contacto con el producto. Dar atención médica si la piel está irritada.

**En caso de contacto con los ojos:** Lavar los ojos separando los párpados con los dedos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. No intentar neutralizar la contaminación con productos químicos. Dar atención médica inmediata.

**En caso de inhalación:** Trasladar al paciente al aire libre. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal.

## ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:

**PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO (CLASE TOXICOLÓGICA II).**

**TOXICIDAD INHALATORIA:** Categoría III (Cuidado).

**IRRITACION DERMAL: LEVE IRRITANTE DERMAL (CUIDADO). CATEGORIA IV:** Evitar el contacto con la piel y la ropa.

**IRRITACION OCULAR: MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO).**

**CATEGORIA III:** Causa irritación moderada a los ojos.

No sensibilizante dermal.

Aplicar tratamiento sintomático y de sostén.

**SINTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA:** Náuseas, vómitos, diarreas, eritema, diarrea, dolor abdominal, irritación ocular, irritación vías respiratorias.

**ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES:** No posee.

Rev. 01

ENTREVERO EC

10 de 11

**CASA CENTRAL**

Albarellos 4914 - (B1605AFR)

Munro - Buenos Aires - Argentina

TE: +54 (11) 4721-3400 / 7400 (Líneas rotativas)

**PLANTA PILAR**

Calle 3 y 8 - (1629)

Parque Industrial Pilar - Buenos Aires

TE: +54 (230) 4496-263/683/685

**PLANTA RIO III**

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio - (5850)

Río III - Córdoba

TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

**PLANTA SAN NICOLAS**

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia) - (2900)

San Nicolás - Buenos Aires

TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

## CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

**CAPITAL FEDERAL:** Unidad Toxicológica del Hospital de Niños de Bs. As Dr. Ricardo Gutiérrez: Sánchez de Bustamante 1399 (C1425DUA), Tel.: (011) 4962 2247/6666.

**BUENOS AIRES:** Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av. Illía s/n, Palomar, Bs. As., Tel.: (011) 4469-9300 interno 1102. Línea gratuita: 0800-333-0160.

**ROSARIO:** Centro Toxicológico Permanente (durante todo el año, 24 horas por día). Tucumán 1544. Tel.: (0341) 448 0077 / 424 2727 o 0800 888 TOXI (8694).

**CORDOBA:** Hospital de Urgencias. Tel: (0351) 427-6200.

**COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA:** No existen antecedentes de potenciación, sinergismo o aditividad.

Rev. 01

ENTREVERO EC

11 de 11

**CASA CENTRAL**  
Albarellos 4914 - (B1605AFR)  
Munro - Buenos Aires - Argentina  
TE: +54 (11) 4721-3400 / 7400 (Líneas rotativas)

**PLANTA PILAR**  
Calle 3 y 8 - (1629)  
Parque Industrial Pilar - Buenos Aires  
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

**PLANTA RIO III**  
Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio - (5850)  
Rio III - Córdoba  
TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

**PLANTA SAN NICOLAS**  
Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia) - (2900)  
San Nicolás - Buenos Aires  
TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743