

Multi-K Granulado

Nitrato de potasio

Riquezas garantizadas

Nitrógeno: 13

Potasio: 38

Grado como elemento: 13-0-38

Grado equivalente: 13-0-46

Reacción en el suelo: Alcalina

Fertilizante de máxima pureza sin contenido de cloruros.

Recomendaciones de uso

Se recomienda su uso en cultivos de: TABACO – ANANA – CITRUS – PARRALES – HORTICOLAS – FRUTALES - OLIVO

CULTIVOS	DOSIS kg/ha	MOMENTO DE APLICACIÓN
Hortalizas de hoja	150	2 aplicaciones cada 20 días
Hortalizas de fruto	200	2 aplicaciones cada 25 días
Hortalizas de raíz	200	2 aplicaciones cada 20 días
Citrus	300-350	Cada 1 a 3 años después e la primera floración
Frutales	200-300	1 aplicación en primavera
Olivo	1,0 kg por árbol	Al finalizar el invierno
Ananá	150	Pre plantación y al inicio del 2do. y 3er. Año
	8,0	Desde un mes después de plantar, cada 30 días hata inducción de floración
Tabaco (Hacer 2 apliaciones después del transplante, cada 20 días)	100	Tabaco Oriental
	200	Tabaco Virginia
	250	Tabaco Burley

Producto inscripto en SENASA con el N° : 10.042

TOMATE-PIMIENTO-AJI- BERENJENA	1,0-1,5	15 días después del trasplante y repetir cada 20 días hasta finalizar la floración
PAPA	1,0-1,5	1ra aplicación después del aporque. 2da antes de la floración. Repetir cada 20 días hasta que el tubérculo tenga la mitad del tamaño normal
CEBOLLA-AJO-ZANAHORIA-NABO-APIO-REMOLACHA	2,0	Iniciar con plantas de 15 cm de altura y repetir cada 20 días
BATATA	1,0	15 días después del trasplante y repetir cada 30 días hasta la cosecha
ARVEJA-POROTO-LENTEJA-GARBANZO	1,0	1ra aplicación cuando comienzan a extenderse las guías, 2da antes de la floración, 3ra a mitad del tamaño de las vainas
SANDIA-MELON-ZAPALLO-ZAPALLITO-PEPINO	1,0-1,5	Comenzar cuando las guías tengan 20 cm, luego repetir cada 15-20 días hasta tamaño normal de los frutos
FRUTILLA	0,5-2,0	Después del trasplante y repetir en cada floración
REPOLLO-COLIFLOR-COLZA	0,5-2,0	Comenzar antes de la formación de las cabezas. Repetir 1-2 veces cada 20 días
LECHUGA-ESPINACA-ACELGA	0,5-1,0	En plena vegetación, cada 20 días hasta el corte
CITRUS	2-3	Desde que se inicia el crecimiento primaveral, después de la floración, cuando las hojas hayan alcanzado 2/3 de su tamaño, Según el estado del cultivo puede ser necesario más de una aplicación con intervalos de 20 días
MANZANO-PERAL	2-6	Desde que se inicia el crecimiento primaveral, después de la floración, cuando las hojas hayan alcanzado 2/3 de su tamaño. Según el estado del cultivo puede ser necesario más de una aplicación con intervalos de 20 días
CIRUELO-DURAZNERO	0,8-1,25	4 o más aplicaciones cada 15-20 días. Desde la caída del 50% de los pétalos hasta fines de diciembre
OLIVO-NOGAL	2,0	3 semanas antes de la fecha prevista para apertura normal de las yemas, para quebrar su dormancia.

Incompatibilidades

Este es un producto incompatible con: Urea, Cianamida de calcio, Escorias thomas, Hiperfosfato y Cal.

Precauciones de uso

No dejar los envases abiertos, pues este producto se humedece en contacto con el aire. La presencia de terrones es normal y no interfiere con la normal solubilidad del producto.

Las aplicaciones foliares y por fertirriego son un complemento y no un sustituto de las fertilizaciones al suelo.

EN APLICACIONES FOLIARES NO PULVERIZAR EN HORAS DE ALTA INSOLACIÓN O ELEVADAS TEMPERATURAS

Producto inscripto en SENASA con el N° : 10.004