



Acerca de la tecnología

- Formulación altamente soluble en agua
- Combinación de Boro con Potasio en una sola molécula patentada
- Formulación libre de sodio
- Muy bajo grado de salinidad

Para asegurar

- Fácil penetración y absorción por los tejidos de la hoja
- Alta resistencia contra condiciones de estrés abiótico
- Plantas sanas
- Más biomasa

Composición	Boro Total solubre en agua (B) 19,4 % Potasio Total soluble en agua (K ₂ 0) 18%	
Formulación	Polvo soluble	

Recomendaciones de uso

	Aplicación Vía Foliar		
CULTIVOS			
	Dosis (kg/ha)	Momento de Aplicación	
Hortalizas			
de fruto	0,5 – 1	Aplicaciones cada 10-14 días a partir de cuaje	
de hoja	0,5	1-2 Aplicaciones cada 7-10 días a partir de formación de cabeza	
de bulbo/raíz	0,5 – 1	1-2 Aplicaciones cada 7-10 días a partir de "llenado" de bulbo/raíz	
Papa	0,5 – 1	Aplicaciones cada 10 - 14 días a partir de inicio de tuberización	
Frutales	1-2	2-3 Aplicaciones cada 10-14 días en crecimiento de fruto	
Cítricos	1 - 1,5	3 Aplicaciones: en prefloración, diametro de fruto de 2,5 cm y en	
		maduración de fruto	
Vid	0,5 – 1,5	3-5 Aplicaciones: en prefloración, 1-3 en crecimiento de fruto, y en	
		poscosecha	
Berries	0,5-1	3-4 Aplicaciones: en prefloración, 1-2 en crecimiento de fruto, y en	
		poscosecha	
Cereales	0,5	1 Aplicación en Hoja Bandera	
Maní y Soja	0,3 - 0,5	1-2 Aplicaciones en R1 y R3	
Algodón	0,3 - 0,5	3 - 5 Aplicaciones a partir de llenado de cápsula	







