

LUPER



Powered by
Foliflo
Technology

La tecnología de alto contenido de nutrientes en suspensión.

LUPER es una suspensión de alto análisis con Manganese (Mn) y Zinc (Zn).

La formulación de LUPER ayuda a promover el crecimiento vegetativo, especialmente promoviendo la fotosíntesis.

La aplicación de LUPER es clave en etapas tempranas de los cultivos para obtener un mejor crecimiento así luego obtener una mayor producción.

Gracias a su proceso de formulación de alta concentración, LUPER es seguro para ser utilizado para corregir o prevenir deficiencias creando buenas condiciones para mejorar las defensas naturales de las plantas.

 **FertiGlobal**®

La nutrición eficiente de los cultivos
combinada con servicios técnicos avanzados

FertiGlobal® puede asegurar las mejores soluciones tecnológicas para fortalecer las plantas durante todas las fases de crecimiento y asegurar el máximo a través del rendimiento saludable de las plantas.



Powered by
Foliflo
Technology

Acerca de la tecnología

- Suspensión de alto contenido de nutrientes
- Formulaciones estables en temperaturas frías y calientes
- Formulaciones a base de agua
- Formulaciones libres de nitrato y cloruro.

Para asegurar

- Fácil penetración / absorción por el tejido de la hoja
- Plantas sanas
- Mayor biomasa
- Sin riesgo de fitotoxicidad

Composición Manganeso total (Mn) 14.4% (250 g/L)
Zinc total (Zn) 20.0% (350 g/L)

Formulación Suspensión concentrada

Recomendaciones de uso

CULTIVOS	Aplicación Vía Foliar	
	Dosis (L/ha)	Momento de Aplicación
Papa	1,5-2,5	Aplicación luego de 1 semana posterior a emergencia. Repetir a los 20 días de ser necesario
Hortalizas de Fruto	1,5-2,5	1-3 Aplicaciones a partir de 4-6 hojas verdaderas cada 15 días
Hortalizas de hoja	1-1,5	1-2 Aplicaciones a partir de 4-6 hojas verdaderas cada 15 días
Hortalizas de bulbo	1-1,5	1-2 Aplicaciones a partir de 3/4 hojas verdaderas cada 15 días
Berries (Arandano, Frutilla, Fambuesa)	1,5-2,5	1-3 aplicaciones cada 15-20 días desde brotación hasta prefloración
Vid	2-2,5	1-2 Aplicaciones cada 20 días a partir de los 30-40 cm de brote
Frutales	2-3	2-3 aplicaciones cada 15-20 días desde brotación hasta prefloración y luego de cuaje de frutos
Kiwi	0,5-1	1 aplicación con brote de 15 cm de longitud. Repetir a los 15-20 días de ser necesario.



FertiGlobal®