

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Metiram pertenece al grupo químico de los alquilbenz (ditiocarbamatos).
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar guantes de goma, botas de goma, delantal impermeable, protector facial. Durante la aplicación usar guantes de goma, botas de goma, overol impermeable, protector facial.
- Aleje los animales domésticos y personas extrañas.
- No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separadamente de la ropa doméstica separadamente de la ropa doméstica.
- Lavarse prolijamente con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.

Síntomas de intoxicación: Pueden presentarse síntomas como dolor de cabeza, vómitos, náuseas.

Primeros auxilios

- **Contacto con los ojos:** retirar lentes de contacto cuando proceda. Lavar los ojos con abundante agua limpia por 10 minutos manteniendo los párpados abiertos. Si ocurre irritación consultar al médico.

- **Contacto con la piel:** sacar la ropa y zapatos contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. Si ocurre irritación consultar al médico.

- **Inhalación:** trasladar al afectado al aire fresco. Dejarlo en reposo. Si no respira proporcionar respiración artificial. Llamar al médico.

- **Ingestión:** no inducir el vómito a menos que sea bajo supervisión médica. Nunca dar nada por la boca si el afectado está inconsciente. Acudir al médico o Centro Asistencial inmediatamente para tratamiento médico.

Tratamiento médico de emergencia: En caso de ingestión no suministrar sustancias que favorezcan la absorción, tales como leche, grasa y alcohol. Se debe suministrar carbón medicinal. El tratamiento posterior es sintomático y de sostén.

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Riesgos ambientales: **Polyram® DF** es tóxico para peces. No contamine cursos de agua. **Polyram® DF** en condiciones normales de uso no es peligroso para abejas y aves.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS". "EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL POSIBLE DAÑO A LA SALUD". "UTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES". "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO". "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA". "NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO". "LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE".

Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.: (56 2) 2640 7000
CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56 2) 2 635 3800 (Atención las 24 horas)
CITUC QUIMICO (Emergencia química): (56 2) 2247 3600

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

BASF

The Chemical Company

Polyram® DF

Fungicida Granulado dispersable (WG)

Fungicida de contacto con acción preventiva para el control de las enfermedades en los cultivos indicados en el cuadro de Instrucciones de Uso.

Composición:

*Metiram..... 70% p/p (700 g/Kg)

Coformulantes, c.s.p..... 100% p/p (1 Kg)

*Amoniato etilbenz (ditiocarbamato)cincico-poli(disulfuro de etilentiuram)

(Corresponde a 80% p/p de Metiram Complejo)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 2052.

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Lote:

Vencimiento:

Contenido neto:Kilos

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Formulado por:

BASF S E

D-67058 Ludwigshafen

Alemania

BASF S.A.

Brasil, 791 - Bairro Eng. Neiva - CEP 12521-40

- Guaratinguetá - SP - Brasil

Importado y Distribuido por:

BASF Chile S.A.

Carrascal 3851

Fono: (56 2) 2640 7000

Casilla 3238

Santiago - Chile

Representante en Chile de BASF S E

© Marca Registrada de BASF

INSTRUCCIONES DE USO

Generalidades: **Polyram® DF**, fungicida de contacto con acción preventiva para el control de las enfermedades y en los cultivos indicados en el cuadro de Instrucciones de Uso. **Polyram® DF**, por ser un producto que actúa por contacto, debe ser aplicado con volumen de agua adecuado para obtener un excelente cubrimiento del follaje y control de las enfermedades.

INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones (*)
Manzanos Perales	Venturia (<i>Venturia spp</i>)	200 - 240 g/100 L agua (4 - 5 Kg/ha)	Aplicar desde puntas verdes a la caída de pétalos, cada 7 días y posteriormente cada 10 a 14 días hasta noviembre aproximadamente. Repetir después de una lluvia. Presenta 18 a 24 horas de acción erradicante (efecto retroactivo). Utilizar las dosis mayores en condiciones de alta presión de las enfermedades. Aplicaciones por temporada: máximo 5 aplicaciones.
Vides	Mldiú (<i>Plasmopara viticola</i>) Escoriosis (<i>Phomopsis viticola</i>)	200 - 240 g/100 L agua (3-3,5 Kg/ha)	Tratamientos preventivos. Aplicar con brote de 5 a 10 cm y si fuera necesario, repetir con racimo formado antes de la floración. Usar la dosis menor en condiciones de baja presión y la mayor en condiciones de alta presión de la enfermedad. Repetir después de una lluvia. Polyram tiene acción sobre escoriosis. Aplicaciones por temporada: máximo 3 aplicaciones.
Cebolla	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>), mldiú (<i>Peronospora destructor</i>)	1,5 - 2,5 Kg/ha	Utilizar en forma preventiva y repetir las aplicaciones cada 7 a 10 días según condiciones e inmediatamente después de una lluvia. En espárragos realizar las aplicaciones con follaje presente, iniciándolas cuando éste tenga aproximadamente 30 cm de altura, ó 2 a 3 semanas después de finalizado el período de cosecha. Emplear como mínimo 200 L agua/ha. Aumentar el volumen de agua a medida que crecen las plantas, en cantidad suficiente para mojar completamente todo el follaje. Utilizar las dosis mayores en condiciones de alta presión de las enfermedades. Aplicaciones por temporada: máximo 5 aplicaciones.
Espárrago	Mancha púrpura (<i>Stemphylium vesicarium</i>)		
Papas y tomates	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>), tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)		
Almacigueras de hortalizas	Caída de almácigos (<i>Pythium spp</i> , <i>Rhizoctonia spp</i> , <i>Phytophthora infestans</i> , <i>Fusarium spp</i>)	100 - 200 g/100 L agua	Tratamientos preventivos. Regar semanalmente el almacigo durante la germinación y emergencia de las plántulas. Utilizar la dosis más baja durante la germinación y las dosis mayores después de la emergencia de las plántulas. Aplicaciones por temporada: máximo 4 aplicaciones.
Desinfección de semillas			
Papas	Sarna común (<i>Streptomyces scabiei</i>)	500 g/ 1.000 Kg de papas	Extender las papas, sobre una superficie sin polvo y asperjar la dosis indicada sobre las papas, girándola para un cubrimiento total, o bien realizar la aplicación a través del equipo de desinfección de semillas de papas. Dejar secar a la sombra antes de la siembra. Utilizar un volumen de agua suficiente para cubrir las semillas. Realizar sólo una aplicación.

Preparación de la mezcla: Preparar la cantidad necesaria de **Polyram® DF** en un poco de agua hasta formar una pasta. Luego adicionarla al estanque a medio llenar de agua con el sistema de agitación en movimiento hasta llenado a volumen total.

Incompatibilidades: **Polyram® DF** no es compatible con productos de fuerte reacción alcalina. No debe mezclarse con aceite.

Compatibilidades: **Polyram® DF** es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. En caso de dudas consultar a nuestro Departamento Técnico.

Fitotoxicidad: Algunas variedades de perales (como D'Anjou) pueden ser sensibles a la aplicación de **Polyram® DF**, recomendándose efectuar una pequeña prueba antes de uso.

Períodos de carencias: Respete carencia de 20 días para manzanos, perales, tomates; 60 días en vides; 10 días para cebolla, papas. En espárragos, almacigueras, y desinfección de semillas no aplica el período de carencia. Para cultivos de exportación, atenerse a las exigencias del país de destino.

Tiempo de reingreso: Para personas, se recomienda una espera de 12 horas. El tiempo de reingreso para animales no es aplicable, ya que el producto no está recomendado en cultivos destinados a pastoreo.



FRANJA VERDE

CUIDADO

